


Ontbrekende tand(en) vervangen door een implantaat

Bij u ontbreekt een tand of kies. In deze folder staat hoe deze tand of kies door middel van een implantaat vervangen kan worden.





Omnimed wil graag
voldoen aan uw wensen.
Wij stellen daarom net als u hoge
eisen aan het eindresultaat en
nemen geen genoegen met
onbevredigende oplossingen.
U mag van ons een optimaal
resultaat verwachten.

Ontbrekende tand(en) vervangen door een implantaat

Waarom een implantaat?

Wanneer een tand, meerdere tanden of kiezen verloren zijn gegaan door bijvoorbeeld een ongeval of omdat een tand of kies verwijderd moet worden, kan de ontbrekende tand of kies worden vervangen door een implantaat.

Deze informatiebrochure gaat over een kroon op een implantaat. De kroon op een implantaat komt op de plaats van de tand of kies die verloren is gegaan. De kroon op een implantaat zit net zo vast als de wortel van een echte tand of kies.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel gemaakt van titanium. Dit speciale metaal is weefselvriendelijk, niet schadelijk voor het lichaam en is heel sterk. Het lichaam ziet titanium als een lichaamseigen stof en neemt het volledig op in het bot. Een implantaat wordt in het kaakbot geplaatst en groeit daarin vast.



In de bovenkaak duurt dit vastgroeien drie maanden en in de onderkaak duurt dit twee maanden. Een implantaat heeft de vorm van een kleine schroef met een diameter van ongeveer 4 millimeter. De binnenzijde is hol met schroefdraad. Hierin wordt een opzetstukje geschroefd, ook wel een abutment genoemd, dat dient als basis voor wat hier op komt. Dit kan een kroon of een brug zijn.



Toepassing van implantaten

Een implantaat kan geplaatst worden wanneer:

- één ontbrekende tand of kies wordt vervangen door een kroon;
- meerdere tanden en/of kiezen ontbreken en worden vervangen door een brug.

Wanneer een implantaat wordt geplaatst op een plek waar één tand of kies mist, kan er een kroon op worden bevestigd. Op een plek waar een aantal tanden of kiezen ontbreken, kan een brug op twee of meer implantaten worden geplaatst.

Bij ons worden implantaten van gerenommeerde firma's gebruikt.

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn kenmerken van deze bedrijven. De producten zijn gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en de betrouwbaarheid en kwaliteit zijn wetenschappelijk bewezen.

Vooronderzoek

Nadat u bent verwezen door uw tandarts, heeft u een afspraak gemaakt bij ons. Tijdens het eerste bezoek nemen wij voldoende tijd om met u uw wensen te bespreken. U wordt onderzocht door een implantoloog. De implantoloog beoordeelt en bespreekt met u of uw wensen mogelijk en uitvoerbaar zijn. Hierbij wordt onder andere de conditie van uw gebit beoordeeld, die in een goede staat moet verkeren. Wanneer een kroon op een implantaat wordt geadviseerd, is aanvullend onderzoek door middel van röntgenfoto's nodig. Er kan dan worden beoordeeld of er voldoende kaakbot aanwezig is om een implantaat te plaatsen. Dit is niet altijd het geval.

Wanneer een tand of kies lang geleden is getrokken, is een deel van het kaakbot verdwenen. Hierdoor is de kaak soms te smal of niet hoog genoeg. Wanneer in zo'n geval een implantaat en kroon worden geplaatst, zal dat leiden tot een esthetisch onbevredigend resultaat. Tijdens het plaatsen van het implantaat is dan een extra ingreep nodig waarbij (kunst)bot wordt aangebracht waarmee de kaak wordt verbreed en verhoogd.

Behandelaarvoorstel

Na het vooronderzoek worden het behandelvoorstel en mogelijke alternatieven met u besproken. Er wordt precies verteld welke behandelingen nodig zijn, de volgorde van de behandelingen, hoe lang het duurt en wat de kosten zijn.

Kosten

De kosten voor het plaatsen van implantaten ten behoeve van een kroon of brug komen meestal niet in aanmerking voor vergoeding uit uw basisverzekering.

Dit betekent dat u de behandeling zelf moet betalen. Een veel voorkomend misverstand, soms ook bij medewerkers van een ziektekostenverzekering, is dat implantaten worden vergoed na het indienen van een behandelplan of een verstrekte machtiging. Alleen implantaten die worden geplaatst in een volledig tandeloze en ernstig geslonken onder- of bovenkaak komen voor vergoeding in aanmerking.

Wanneer u een aanvullende verzekering voor tandheelkunde bij uw ziektekostenverzekering heeft afgesloten, is het mogelijk dat u voor gedeeltelijke vergoeding van een implantaatbehandeling in aanmerking komt.

Dit betekent dat u de nota eerst zelf moet betalen. Daarna kunt u de nota samen met de specificatie indienen bij uw zorgverzekering. Deze wordt door uw zorgverzekeraar volgens de geldende polisvoorwaarden behandeld. Bij het eerste consult zullen wij u een begroting van de kosten meegeven. De kosten voor de implantaatbehandeling wisselen per jaar.

Vorbereiding

Bij het eerste consult wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand en de geneesmiddelen die u eventueel gebruikt. Vooral het gebruik van een bloedverdunnende geneesmiddelen zijn van belang. Soms is het nodig dat u voorafgaande aan de behandeling tijdelijk moet stoppen met het innemen van bloedverdunders. Dit overlegt de implantoloog met u. Er wordt dan ook aangegeven wanneer u weer mag beginnen met deze medicijnen. U kunt voor de operatie normaal eten en drinken. U hoeft dus niet nuchter te zijn.

Het bot

Een implantaat kan alleen worden geplaatst als er voldoende kaakbot is.



Wanneer er te weinig bot aanwezig is, wordt het implantaat geplaatst en wordt gelijktijdig kunstbot aangebracht. Het implantaat is daarna meestal zichtbaar.

Maar soms wordt het implantaat en het aangebrachte kunstbot bedekt met tandvlees. Het implantaat dan is dus niet zichtbaar.

Na drie maanden vindt een tweede ingreep plaats waarbij het implantaat alsnog zichtbaar wordt gemaakt (vrijgelegd) waarna de kroon kan worden geplaatst. Er zijn dan dus twee ingrepen nodig.

Plaatsen van het implantaat of de implantaten

Onder plaatselijke verdoving wordt het implantaat door de implantoloog in de kaak aangebracht. De verdoving is vergelijkbaar met die voor het trekken van een tand of kies. Tijdens de behandeling wordt een steriele doek over u heen gelegd. Ook uw hoofd en ogen worden afgedekt zodat u niet wordt verblind door de felle operatielamp. U kunt wel onder het doek doorkijken. Het is altijd mogelijk om gedurende de behandeling enkele woorden met de implantoloog te wisselen. Tijdens de behandeling wordt een snee in het tandvlees gemaakt om het kaakbot zichtbaar te maken. In het bot wordt een gaatje geboord waarin het implantaat wordt geplaatst. U voelt hierbij een trilling maar geen pijn.

Tot slot wordt het tandvlees gehecht. Direct boven het tandvlees is het bovenste gedeelte van het implantaat zichtbaar. Hierop wordt later de kroon bevestigd. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Na de behandeling kunt u weer naar huis. Het is wel verstandig dat u zich door iemand laat begeleiden die u naar huis brengt. U hebt toch een behandeling ondergaan en bent hierdoor misschien minder oplettend in het verkeer.

Om het implantaat of de implantaten goed te laten vastgroeien in het kaakbot moet het in de onderkaak twee maanden en in de bovenkaak drie maanden niet worden belast. Dat wil zeggen dat er geen krachten op mogen komen. Een gedeeltelijk kunsthars plaatje dat de afwezig tanden en/of kiezen vervangt, kan meestal direct na de behandeling worden aangepast zodat u het weer kunt dragen.

Risico's

Geen enkele operatie is zonder risico's. Ook bij het aanbrengen van (kunst)bot of een implantaat kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding en een wondinfectie. Daarbij kan een gevoelsstoornis van de onderlip of kin optreden. De kans hierop is echter heel klein en de stoornis is vrijwel altijd van tijdelijke aard. Er is een kleine kans, ongeveer 3%, dat een implantaat niet goed vastgroeit in het kaakbot en moet worden verwijderd. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan wordt met u overlegd of een opnieuw een implantaat wordt geplaatst of dat beter voor een andere oplossing kan worden gekozen. Roken vertraagt de wondgenezing. Dit betekent dat roken het vastgroeien van de implantaten kan verstoren. U wordt daarom verzocht niet te roken tijdens het gehele behandeltraject.

Na de ingreep

Pijn

De plaatselijke verdoving is na één tot twee uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Die pijn is goed te bestrijden door het innemen van een pijnstillend middel. U krijgt hiervoor een recept mee dat u kunt inleveren bij uw apotheek of apotheekhoudende huisarts. Gebruik de voorgeschreven pijnstillers in de aangegeven dosering. Het beste kunt u beginnen met innemen van de pijnstillers voordat de verdoving is uitgewerkt.

Zwelling en verkleuring

De eerste dagen na de ingreep kan er zwelling optreden en verkleuring van de huid van lippen en wang. Dat is normaal en een gevolg van de ingreep. De zwelling zal na drie dagen het grootst zijn en wordt dan vanzelf minder om tenslotte te verdwijnen. Soms duurt dit langer dan een week.

Mondverzorging

Het is van belang uw mond zo schoon mogelijk te houden. U krijgt een recept mee voor een mondspoelmiddel. Hiermee moet u vanaf de dag na de ingreep uw mond vier keer per dag spoelen. Wanneer de wond voldoende is genezen, moet u het implantaat met de rest van de tanden en kiezen gaan poetsen. Gebruik in het begin een zachte tandenborstel voor reinigen van het implantaat. Goede reiniging is van groot belang om infectie en daardoor de kans op verlies van het implantaat te voorkomen.

Hechtingen

De hechtingen lossen na één tot twee weken op en verdwijnen dus vanzelf.

Controle na de ingreep

Na de operatie krijgt u een afspraak voor controle. Hierbij wordt de wondgenezing beoordeeld en heeft u gelegenheid om eventuele vragen te stellen. Mochten er vragen of problemen zijn dan kunt u ons tussentijds altijd bellen.

De kroon of brug

Twee tot drie maanden na het plaatsen van het implantaat of implantaten kan begonnen worden met het maken van de kroon of brug. Dit zal uw eigen tandarts voor u verzorgen.

Alternatieve behandelingen

Voor de vervanging van een ontbrekende tand, tanden, kies of kiezen is de implantaatbehandeling vaak de beste oplossing. Het is een esthetisch fraaie optie en het is een vaste en stevige voorziening. Daarbij is het over het algemeen een heel voorspelbare en een duurzame behandeling. Soms is het plaatsen van een implantaat niet mogelijk of is het beter om voor een andere behandeling te kiezen en zal er gezocht moeten worden naar een alternatief. Een aantal alternatieven staan hieronder beschreven.

Brug

Dit is een esthetisch fraaie en ook een vaste voorziening. Hiervoor moeten echter wel de buurelementen beslepen worden. Wanneer deze elementen nagenoeg gaaf zijn is dit niet de behandeling van eerste keus. De kosten zijn vergelijkbaar met die van een implantaatbehandeling.




Etsbrug

De etsbrug is er in verschillende soorten. Het is een fraaie en vaste voorziening die vrij goedkoop is. Omdat het wordt vastgelijmd kan het losraken.




Plaatje

Dit is een fraaie, simpele en goedkope voorziening die vooral geschikt is voor kortdurend gebruik. Het voelt niet eigen aan, zit vrij los in de mond en kan op de langere termijn schade toebrengen aan de rest van het gebit en is hinderlijk bij het eten.



Frame

Dit is een uitneembare gegoten metalen prothese die houvast heeft met haakjes om de eigen tanden en kiezen. Zeker wanneer meerdere tanden en kiezen ontbreken en wanneer de conditie van het restgebit matig is, is dit een goed en relatief goedkoop alternatief. Voor optimaal comfort bij het dragen van een dergelijk frame kan er soms voor gekozen worden om een implantaat te plaatsen voor het geven van extra houvast.





Oedsmawei 24
9001 ZJ Grou

Telefoon 0566 82 00 20
info@omnimed.nl
www.omnimed.nl