



Oedsmawei 24  
9001 ZJ Grou

Telefoon 0566 82 00 20  
info@omnimed.nl  
www.omnimed.nl

Omnimed wil graag voldoen aan uw wensen. Wij stellen daarom net als u hoge eisen aan het eindresultaat en nemen geen genoegen met onbevredigende oplossingen.  
U mag van ons een optimaal resultaat verwachten.

## Instructies na een operatie in de mond

U bent bij Omnimed kaakchirurgie en implantologie geweest voor een operatie in de mond. In deze folder vindt u informatie en aanwijzingen die van belang zijn na deze behandeling.



## Instructies na een operatie in de mond

U bent bij Omnimed kaakchirurgie en implantologie geweest voor een operatie in de mond. In deze folder vindt u informatie en aanwijzingen die van belang zijn na deze behandeling.

### Verdoving

Er wordt een plaatselijke verdoving gebruikt, die drie kwartier tot soms enkele uren werkzaam kan zijn. Gedurende die tijd moet u voorzichtig zijn met het eten en drinken van warme spijzen en dranken. U voelt immers niet of u op uw lip bijt of dat de drank te heet is.

### Pijn

Nadat de verdoving is uitgewerkt kunt u pijn krijgen. Om de pijn te bestrijden, kunt u pijnstillers gebruiken. Gebruikt u bij voorkeur géén aspirine. Paracetamol is prima om te gebruiken. Mocht de pijn na twee dagen ernstiger in plaats van minder worden, dan is het verstandig om contact op te nemen met onze praktijk.

### Nabloeden

De eerste uren na de operatie kan de wond wat nabloeden. Een beetje rood gekleurd speeksel is dan normaal. U moet uw mond niet spoelen, omdat u daardoor het ontstaan van een stolsel verhindert. Komt er steeds bloed uit de wond, dan kunt u de bloeding stoppen door een half uur op een opgevouwen gaasje of schoon doekje te bijten. Helpt deze methode onvoldoende, neem dan contact op met onze praktijk. Ook 's avonds en 's nachts is er iemand bereikbaar.

### Zwelling

Het zwellen van de wang of van de lip met een blauw-groene verkleuring is vaak een normaal verschijnsel. U kunt het zwellen tegengaan door de eerste uren na de ingreep de wang te koelen door middel van een coldpack of een plastic zak met ijsblokjes. Door de zwelling kan het zijn dat u uw mond enige dagen niet helemaal open kunt doen. Meestal neemt de zwelling tussen de tweede en vijfde dag af.

### Mondhygiëne

Het is van belang om uw mond zo schoon mogelijk te houden door regelmatig de tanden te poetsen met een tandenborstel en tandpasta. Vaak heeft u een recept voor een mondspoelmiddel meegekregen. Alleen de mond spoelen is niet voldoende. Dit geeft tijdelijk het gevoel van een lekkere frisse mond, maar spoelen reinigt de mond zeker niet. Of als u geen tanden en kiezen meer heeft dan reinigt u

de mond door vanaf de dag na de behandeling te spoelen met het mondspoelmiddel of zout water. Probeer u zo normaal mogelijk te eten eventueel gepureerd voedsel. U hoeft zeker geen maaltijden over te slaan.

### Hechtingen

In de meeste gevallen is de wond gehecht met hechtmateriaal dat na één tot twee weken vanzelf oplost. Soms is hechtmateriaal gebruikt dat niet oplosbaar is. De kaakchirurg verwijdert dan de hechtingen bij de volgende afspraak.

### Vragen

Verloopt de genezing niet zoals de kaakchirurg heeft verteld, neemt u dan contact op met onze praktijk. Het is niet nodig om uw huisarts of tandarts hierover te raadplegen.

Om uw probleem of vraag aan ons voor te leggen kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0566– 820020.

### Spoed

Voor spoedgevallen kunt u ons bereiken buiten kantooruren op telefoonnummer 06 55 68 40 88.